

第3回関東支部主催内科トレーニング

クイズ形式で学習する 血液疾患エマージェンシーの見分け方

講師: 須永 眞司 (小平記念東京日立病院)

開催日時: 平成24年3月24日(土)

開催会場: 日内会館

(当日配布用資料)

2/2
6/12
10

♪ 緊急性が一番高いのはどれでしょうか？

| | | | |
|----------|---|----------|--|
| 1 | WBC 4100 / μ L Hb 5.2 g/dL MCV 72.6 fL PLT 39.3万 / μ L | 2 | WBC 87,000 / μ L Hb 11.6 g/dL MCV 99.1 fL PLT 42.6万 / μ L |
| 3 | WBC 7100 / μ L Hb 13.5 g/dL MCV 91.9 fL PLT 2.3万 / μ L | 4 | WBC 960 / μ L Hb 9.2 g/dL MCV 102.3 fL PLT 5.5万 / μ L |

➤ いずれの患者さんも、症状はほとんどありません。

症例 1

症例 1

【患者】 44歳男性

【主訴】 なし（赤血球増加の精査）

【現病歴】

自覚症状はない。

健診で赤血球増加を指摘され受診。

【既往歴】 高尿酸血症

【生活歴】 喫煙10本/日、機会飲酒、常用薬なし

| | 4年前 | 3年前 | 2年前 | 1年前 | 1ヶ月前 |
|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| WBC (/ μ L) | 5500 | 5100 | 5200 | 6000 | 9200 |
| RBC (/ μ L) | 640万 | 564万 | 557万 | 616万 | 760万 |
| Hb (g/dL) | 20.6 | 18.8 | 17.7 | 19.3 | 19.8 |
| Ht (%) | 63.8 | 56.7 | 56.4 | 61.6 | 64.5 |
| Plt (/ μ L) | 18.5万 | 32.6万 | 39.5万 | 62.0万 | 74.5万 |

症例 1 (つづき)

症例 1

【身体所見】

長身、筋肉質の男性。

頬がやや紅潮している。

血圧 120/70 mmHg, SpO₂ 97%

胸部聴診：異常なし。

腹部：肝臓・脾臓を触知しない。

上肢：パチ指なし。

下腿：浮腫なし。

再検査しました

症例 1

| | | | | | |
|------|----------------|--------------|------------|-----|------------|
| WBC | 9300 / μ L | BUN | 11.1 mg/dL | EPO | 11.6 mU/mL |
| band | 1 % | Cre | 0.92 mg/dL | | (NL 8-36) |
| seg | 77 % | UA | 9.2 mg/dL | | |
| eos | 3 % | AST | 24 IU/L | | |
| bas | 1 % | ALT | 37 IU/L | | |
| mon | 5 % | LDH | 342 IU/L | | |
| lym | 13 % | ALP | 162 IU/L | | |
| RBC | 774万/ μ L | γ GTP | 71 IU/L | | |
| Hb | 19.9 g/dL | CRP | 0.10 mg/dL | | |
| Ht | 65.0 % | | | | |
| MCV | 84.0 fL | | | | |
| MCH | 25.7 pg | | | | |
| MCHC | 30.6 % | | | | |
| Plt | 75.8万/ μ L | | | | |

症例2

症例2

【患者】 74歳女性

【主訴】 労作時の息切れ

【現病歴】

高血圧で外来に通院中。

アムロジピン5 mg/日で血圧はコントロールされていた。

1年ぶりに血液検査をしたところ、貧血が認められた。

最近、坂道を上るときに軽度の息切れがあるが、本人は年齢のせいと思っていた。

【既往歴】 子宮筋腫術後

【身体所見】

血圧 128/78 mmHg

胸部: 前胸部で収縮期雑音 II/VI

下肢: 浮腫なし

血液検査

症例2

| | | | |
|------|----------------|--------------|------------|
| WBC | 4840 / μ L | BUN | 12.7 mg/dL |
| neu | 65.1 % | Cre | 0.63 mg/dL |
| eos | 2.3 % | AST | 18 IU/L |
| bas | 0.6 % | ALT | 11 IU/L |
| mon | 6.8 % | LDH | 180 IU/L |
| lym | 25.2 % | ALP | 192 IU/L |
| RBC | 345万/ μ L | γ GTP | 9 IU/L |
| Hb | 9.1 g/dL | LDL | 112 mg/dL |
| Ht | 28.2 % | HDL | 80 mg/dL |
| MCV | 81.7 fL | TG | 118 mg/dL |
| MCH | 26.4 pg | | |
| MCHC | 32.3 % | | |
| Plt | 24.6万/ μ L | | |

症例3

症例3

【患者】 65歳男性

【主訴】 労作時息切れ, 労作時の前胸部痛

【現病歴】

3週間ほど前から易疲労。

労作時の息切れや前胸部痛が出現。

徐々に増悪するため受診。

【身体所見】

中肉中背の男性。

血圧 114/68 mmHg, 結膜貧血(+), 黄疸(-)

頸部, 腋窩, 鼠径リンパ節腫脹なし

胸・腹部: 異常所見なし

下腿: 浮腫なし

健診のデータ

症例3

- 患者は毎年, 人間ドッグを受けていた。
- 約10ヶ月前の健診で, 軽度の貧血を指摘されていたが, 経過観察(1年後再検)の判定を受けていた。
- 10ヶ月前の健診時には, 便潜血陰性, 上部消化管造影異常なし。

| | 4年前 | 3年前 | 2年前 | 10ヶ月前 | 本日 |
|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| WBC (/ μ L) | 6400 | 3920 | 4070 | 3420 | 2170 |
| RBC (/ μ L) | 402万 | 395万 | 352万 | 356万 | 150万 |
| Hb (g/dL) | 13.3 | 13.3 | 12.1 | 11.9 | 5.4 |
| Ht (%) | 38.2 | 37.7 | 35.1 | 36.8 | 15.1 |
| Plt (/ μ L) | 14.4万 | 16.1万 | 17.9万 | 23.4万 | 21.8万 |

血液検査

症例3

| | | | |
|------------|-------------------------------|--------------|------------|
| WBC | 2170 / μ L | BUN | 20.2 mg/dL |
| seg | 28 % | Cre | 0.93 mg/dL |
| eos | 10 % | AST | 39 IU/L |
| bas | 0 % | ALT | 41 IU/L |
| mon | 8 % | LDH | 199 IU/L |
| lym | 54 % | ALP | 155 IU/L |
| RBC | 150万/μL | γ GTP | 71 IU/L |
| Hb | 5.4 g/dL | CRP | 0.12 mg/dL |
| Ht | 15.1 % | | |
| MCV | 100.7 fL | | |
| MCH | 36.0 pg | | |
| MCHC | 35.8 % | | |
| Plt | 21.8万/ μ L | | |
| Ret | 0.4 % | | |

その他の検査

症例3

- 胸部X線検査

心拡大なし, 肺野に異常なし, 大動脈弓がやや拡大.

- 心電図

V4-6でSTわずかに低下, 異常Q波なし

症例4

症例4

【患者】36歳女性

【主訴】皮下出血(紫斑)

【現病歴】

数日前から, 急に手足に紫斑が出現.

紫斑の数が増えてきたため, 心配になり受診.

【身体所見】

長身, 痩せ型の女性.

結膜貧血(-), 黄疸(-), 咽頭発赤(-), 扁桃腫脹(-)

頸部リンパ節腫脹(-)

四肢に1-3 cm大の不整形の紫斑散在. 下腿には点状出血もある.

血液検査

症例4

| | | | |
|------------|-------------------------------|-----|------------|
| WBC | 5670 / μ L | BUN | 12.1 mg/dL |
| RBC | 425万/ μ L | Cre | 0.51 mg/dL |
| Hb | 12.9 g/dL | AST | 56 IU/L |
| Ht | 38.2 % | ALT | 37 IU/L |
| MCV | 89.9 fL | LDH | 204 IU/L |
| MCH | 30.4 pg | CRP | 0.04 mg/dL |
| MCHC | 33.8 % | | |
| Plt | 0.2万/μL | | |
| APTT | 30.3 sec | | |
| PT-INR | 1.05 | | |
| Fbg | 355 mg/dL | | |

症例5

症例5

【患者】 50歳男性
 【主訴】 発熱, 咽頭痛
 【現病歴】

10日くらい前から発熱, 咽頭痛が出現。
 抗生剤を投与したが, 解熱せず, 咽頭痛も軽快しない。
 発熱を繰り返すため, 血液検査を施行した。

【身体所見】

中肉中背の男性. 消耗している。
 血圧 112/70 mmHg, 体温 38.4°C, SpO₂ 97%
 結膜貧血(-), 黄疸(-), 頸部に1-2cm大のリンパ節を数個触知。
 胸部: 胸骨左縁で収縮期雑音Ⅱ/Ⅵを聴取。

血液検査

症例5

| | | | |
|------------|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------|
| WBC | 212,030 /μL | TP | 6.7 g/dL |
| blast | 98.5 % | Alb | 3.9 g/dL |
| band | 0.0 % | BUN | 13.2 mg/dL |
| seg | 0.0 % | Cre | 1.11 mg/dL |
| eos | 0.0 % | UA | 6.3 mg/dL |
| bas | 0.0 % | AST | 48 IU/L |
| mon | 0.0 % | ALT | 29 IU/L |
| lym | 1.5 % | LDH | 910 IU/L |
| RBC | 309万/μL | ALP | 527 IU/L |
| Hb | 9.9 g/dL | γGTP | 462 IU/L |
| Ht | 29.9 % | CRP | 6.61 mg/dL |
| MCV | 96.8 fL | | |
| MCH | 32.0 pg | | |
| MCHC | 33.1 % | | |
| Pit | 6.4万/μL | | |

症例6

症例6

【患者】 35歳男性
 【主訴】 倦怠感, 易疲労感, 微熱
 【現病歴】

2-3ヶ月前から易疲労感があったが, 仕事が忙しく放置していた。
 2週間ほど前から微熱が出現。
 全身倦怠感も悪化してきたため, 受診。

【身体所見】

中肉中背の男性. 比較的元気。
 血圧 110/70 mmHg, SpO₂ 98%, 結膜貧血(+), 黄疸(-)
 胸・腹部: 異常所見なし
 下腿: 浮腫なし

血液検査

症例6

| | | | |
|------------|-----------------------------------|--------------|------------------------------|
| WBC | 327,600 /μL | BUN | 21.6 mg/dL |
| RBC | 298万/μL | Cre | 0.98 mg/dL |
| Hb | 9.0 g/dL | AST | 56 IU/L |
| Ht | 26.8 % | ALT | 37 IU/L |
| MCV | 89.9 fL | LDH | 586 IU/L (NL 125-220) |
| MCH | 30.2 pg | ALP | 187 IU/L |
| MCHC | 33.6 % | γ GTP | 66 IU/L |
| Pit | 36.0万/μL | CRP | 0.42 mg/dL |

血液検査 (血液像を含む)

症例6

| | |
|------------------------------|----------------------------------|
| WBC 327,600 / μ L | BUN 21.6 mg/dL |
| blast 9.5 % | Cre 0.98 mg/dL |
| pro 15.0 % | AST 56 IU/L |
| mye 22.5 % | ALT 37 IU/L |
| met 5.0 % | LDH 586 IU/L (NL 125-220) |
| band 7.0 % | ALP 187 IU/L |
| seg 28.5 % | γ GTP 66 IU/L |
| eos 6.0 % | CRP 0.42 mg/dL |
| bas 2.5 % | |
| mon 0.0 % | |
| lym 4.0 % | |
| Erb 2/200 WBC | |
| Hb 9.0 g/dL | |
| Plt 36.0万/ μ L | |

症例7

症例7

【患者】 79歳男性

【主訴】 発熱, 労作時息切れ

【現病歴】

2ヶ月ほど前から労作時息切れが出現。

近医で、「虚血性心疾患, 心不全」と言われ入院。

利尿薬などを投与されて退院したが, その後も息切れが続いた。

1週間前から38°C超の発熱も出現し, 食事が摂れないため受診。

【身体所見】

中肉中背の男性. 認知症はない. 息切れが強く, 車イスで来院。

結膜貧血(+), 黄疸(-), 頸部リンパ節腫脹(-)

胸部: 前胸部で収縮期雑音を聴取

下腿: 浮腫なし

血液検査

症例7

| | |
|-----------------------------|------------------------|
| WBC 18,820 / μ L | TP 6.9 g/dL |
| blast 6.0 % | Alb 3.7 g/dL |
| band 1.0 % | BUN 31.5 mg/dL |
| seg 3.0 % | Cre 2.48 mg/dL |
| eos 0.0 % | AST 28 IU/L |
| bas 0.0 % | ALT 15 IU/L |
| mon 70.5 % | LDH 345 IU/L |
| lym 19.5 % | Na 135 mEq/L |
| RBC 267万/ μ L | K 4.7 mEq/L |
| Hb 9.2 g/dL | Cl 97 mEq/L |
| Ht 26.8 % | CRP 12.83 mg/dL |
| MCV 100.4 fL | |
| Plt 9.5万/ μ L | |

症例8

症例8

【患者】 45歳男性

【主訴】 紫斑, 労作時息切れ

【現病歴】

2-3週間前から労作時息切れを自覚。

日常生活に支障はないので放置していた。

数日前から, 四肢や前胸部に点状出血や紫斑が出現したため, 外来受診。

【身体所見】

中肉中背の男性. 比較的元気。

血圧 132/82 mmHg, 体温 36.1°C, SpO₂ 98%

結膜貧血(+), 黄疸(-), 口腔内出血(-), 歯肉腫脹(-)

前胸部, 四肢に点状出血と紫斑が散在

血液検査

症例8

| | | | |
|------------|--------------------------------|--------------|-----------------|
| WBC | 3340 /μL | TP | 7.9 g/dL |
| blast | 42.5 % | Alb | 4.4 g/dL |
| pro | 1.5 % | BUN | 17.3 mg/dL |
| band | 0.0 % | Cre | 0.76 mg/dL |
| seg | 7.5 % | AST | 98 IU/L |
| eos | 0.0 % | ALT | 256 IU/L |
| bas | 0.0 % | LDH | 514 IU/L |
| mon | 0.0 % | ALP | 176 IU/L |
| lym | 48.5 % | γ GTP | 95 IU/L |
| RBC | 235万/μL | CRP | 1.31 mg/dL |
| Hb | 7.9 g/dL | | |
| Ht | 22.2 % | | |
| MCV | 94.5 fL | | |
| MCH | 33.6 pg | | |
| MCHC | 35.6 % | | |
| Pit | 1.5万/μL | | |

症例9

症例9

【患者】 63歳男性
 【主訴】 労作時息切れ
 【現病歴】

糖尿病で外来へ通院。

1年ほど前から、徐々に貧血、体重減少が進行。

数日前から労作時の息切れが悪化し、食欲も低下。仕事にも支障をきたすようになったため、外来受診。

【身体所見】

中肉中背の男性。やや衰弱している。

血圧 106/60 mmHg, 体温 36.2°C, SpO₂ 97%

結膜貧血(+), 黄疸(-), 口腔内出血(-), 歯肉腫脹(-)

頸部リンパ節腫脹(-)

血液検査

症例9

| | | | |
|------------|--------------------------------|--------------|------------------|
| WBC | 5540 /μL | TP | 6.5 g/dL |
| neu | 72.5 % | Alb | 3.7 g/dL |
| eos | 3.8 % | BUN | 24.1 mg/dL |
| bas | 0.4 % | Cre | 0.71 mg/dL |
| mon | 0.9 % | AST | 49 IU/L |
| lym | 22.4 % | ALT | 23 IU/L |
| RBC | 138万/μL | LDH | 2362 IU/L |
| Hb | 5.1 g/dL | ALP | 132 IU/L |
| Ht | 14.5 % | γ GTP | 13 IU/L |
| MCV | 105.1 fL | CK | 68 IU/L |
| MCH | 37.0 pg | 随時血糖 | 260 mg/dL |
| MCHC | 35.2 % | CRP | 1.29 mg/dL |
| Pit | 10.9万/μL | | |
| Ret | 0.4 % | | |

症例10

症例10

【患者】 42歳女性
 【主訴】 立ちくらみ, ふらつき
 【現病歴】

半年くらい前に、通勤途上の電車内で失神発作を生じ救急搬送。その際、貧血を指摘され、鉄剤を内服した。

その後も会社の定期健診で貧血を指摘。

立ちくらみやふらつきも増えてきたために、病院を受診するよう産業医から指導を受けた。

【身体所見】

痩せ型の女性。比較的元気。

血圧 96/62 mmHg, 体温 36.0°C, SpO₂ 98%

結膜貧血(+), 黄疸(-)

胸腹部に異常な所見はない。

血液検査

症例10

| | | | |
|------------|--------------------------------|--------------|------------|
| WBC | 4230 /μL | TP | 6.0 g/dL |
| neu | 68.8 % | Alb | 4.0 g/dL |
| eos | 5.2 % | BUN | 12.8 mg/dL |
| bas | 2.1 % | Cre | 0.51 mg/dL |
| mon | 5.0 % | UA | 4.2 mg/dL |
| lym | 18.9 % | AST | 11 IU/L |
| RBC | 208万/μL | ALT | 10 IU/L |
| Hb | 4.3 g/dL | LDH | 126 IU/L |
| Ht | 16.2 % | ALP | 100 IU/L |
| MCV | 77.9 fL | γ GTP | 10 IU/L |
| MCH | 20.7 pg | CRP | 0.01 mg/dL |
| MCHC | 26.5 % | | |
| Plt | 45.5万/μL | | |

症例11

症例11

【患者】58歳男性

【主訴】なし（血小板減少の精査）

【現病歴】

数年前から健診で血小板減少を指摘されていたが、症状はなく、放置していた（過去のデータは持参せず）。

今回の健診でも「要精査」の判定となり、精査を希望して受診。

【既往歴】特記事項なし

【生活歴】2年前までタバコ 20本/日、飲酒5-6回/週、ビール1-2本

【身体所見】

やや小柄、小太りの男性。

結膜貧血(-)、黄疸(-)

口腔内出血(-)、皮膚に皮下出血(-)。

血液検査

症例11

| | | | |
|------------|--------------------------------|--------------|------------|
| WBC | 7500 /μL | BUN | 14.9 mg/dL |
| seg | 52.5 % | Cre | 0.95 mg/dL |
| eos | 6.0 % | AST | 22 IU/L |
| bas | 0.5 % | ALT | 19 IU/L |
| mon | 8.0 % | LDH | 190 IU/L |
| lym | 33.0 % | ALP | 133 IU/L |
| RBC | 445万/μL | γ GTP | 65 IU/L |
| Hb | 15.2 g/dL | | |
| Ht | 44.7 % | | |
| MCV | 100.4 fL | | |
| MCH | 34.2 pg | | |
| MCHC | 34.0 % | | |
| Plt | 4.6万/μL | | |

症例12

症例12

【患者】52歳男性

【主訴】なし（白血球増加の精査）

【現病歴】

2ヶ月前に下血。十二指腸潰瘍と診断され、PPIを処方された。

その際に血液検査を受け、貧血と白血球増加を指摘。

鉄剤により貧血は改善したが、白血球増加が続いている。

【既往歴】特記事項なし

【生活歴】タバコ 20本/日、飲酒 毎日、ビール1本+ α

【身体所見】

やや大柄な男性。一見、健康体。

結膜貧血(-)、黄疸(-)

頸部・腋窩・鼠径にリンパ節腫脹なし。

血液検査

症例12

| | | | |
|------------|----------------------------------|-------------------------------|-----------------|
| WBC | 20,100 /μL | BUN | 11.1 mg/dL |
| pro | 0.5 % | Cre | 0.70 mg/dL |
| mye | 3.0 % | AST | 32 IU/L |
| met | 4.0 % | ALT | 20 IU/L |
| band | 2.0 % | LDH | 396 IU/L |
| seg | 57.0 % | ALP | 266 IU/L |
| eos | 2.5 % | γGTP | 74 IU/L |
| bas | 10.0 % | CRP | 0.20 mg/dL |
| mon | 8.5 % | | |
| lym | 12.5 % | | |
| RBC | 486万/ μ L | | |
| Hb | 11.6 g/dL | | |
| Ht | 38.8 % | | |
| MCV | 79.8 fL | | |
| MCH | 23.9 pg | | |
| MCHC | 29.9 % | | |
| Plt | 43.4万/μL | | |

症例13

症例13

【患者】 48歳男性

【主訴】 なし（赤血球増加の精査）

【現病歴】

数年前から、健診で赤血球増加を指摘。症状はない。

今回の健診で、Hb 20 g/dLを超えたため、受診を勧められた。

【既往歴】 特記事項なし

【生活歴】 タバコ 10本/日、飲酒 毎日、ビール1-2本

【身体所見】

肥満体の男性。血圧 144/86 mmHg, SpO₂ 98%

結膜やや充血

胸部聴診上、異常はない。

血液検査

症例13

| | | | |
|------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------|
| WBC | 7200 /μL | BUN | 11.4 mg/dL |
| neu | 58.3 % | Cre | 0.80 mg/dL |
| eos | 4.6 % | UA | 6.5 mg/dL |
| bas | 0.6 % | TC | 233 mg/dL |
| mon | 7.1 % | AST | 24 IU/L |
| lym | 29.4 % | ALT | 44 IU/L |
| RBC | 610万/μL | LDH | 164 IU/L |
| Hb | 20.1 g/dL | ALP | 201 IU/L |
| Ht | 55.6 % | γGTP | 84 IU/L |
| MCV | 91.1 fL | | |
| MCH | 33.0 pg | | |
| MCHC | 36.2 % | | |
| Plt | 21.2万/μL | | |

症例14

症例14

【患者】 64歳女性

【主訴】 なし（白血球増加の精査）

【現病歴】

自覚症状はない。

3ヶ月前に健診を受けたところ、白血球増加を指摘。

再検査を受けるよう勧められたために、受診した。

【既往歴】 虫垂炎手術(30歳代)

【生活歴】 主婦、タバコ:(-), 飲酒:機会飲酒

【身体所見】

中肉、中背の女性。血圧 108/70 mmHg, SpO₂ 97%

結膜貧血(-), 黄疸(-), 頸部リンパ節腫脹(-)

胸部聴診上、異常はない。

症例14

血液検査

| | | | |
|------------|--------------------------------|--------------|------------|
| WBC | 9440 /μL | TP | 7.9 g/dL |
| band | 1.0 % | Alb | 5.1 g/dL |
| seg | 20.5 % | BUN | 16.0 mg/dL |
| eos | 0.0 % | Cre | 0.74 mg/dL |
| bas | 0.0 % | UA | 4.8 mg/dL |
| mon | 4.0 % | TC | 189 mg/dL |
| lym | 74.5 % | AST | 24 IU/L |
| RBC | 426万/μL | ALT | 17 IU/L |
| Hb | 13.1 g/dL | LDH | 220 IU/L |
| Ht | 38.8 % | ALP | 168 IU/L |
| MCV | 91.1 fL | γ GTP | 28 IU/L |
| MCH | 30.8 pg | CRP | 0.04 mg/dL |
| MCHC | 33.8 % | | |
| Plt | 31.6万/ μ L | | |

症例15

症例15

【患者】 73歳男性
 【主訴】 労作時息切れ, 易疲労
 【現病歴】
 肥大型心筋症, 不整脈(心室性期外収縮)で通院。
 2週間前から労作時の息切れが出現。
 疲れやすくなり, 息切れも徐々に悪化するため, 受診した。

【身体所見】
 やや大柄, 軽度肥満体の男性. 普通に歩行可能。
 血圧 128/76 mmHg, 体温 36.2°C
 結膜貧血(+), 黄疸(-), 頸部リンパ節腫脹(-)
 胸部: 胸骨左縁で収縮期雑音 II /VIを聴取。

症例15

血液検査

| | | | |
|------------|--------------------------------|--------------|-----------------|
| WBC | 1400 /μL | TP | 7.8 g/dL |
| band | 0.0 % | Alb | 3.4 g/dL |
| seg | 25.0 % | BUN | 13.6 mg/dL |
| eos | 0.0 % | Cre | 0.94 mg/dL |
| bas | 0.0 % | UA | 5.4 mg/dL |
| mon | 10.0 % | AST | 35 IU/L |
| lym | 65.0 % | ALT | 29 IU/L |
| RBC | 217万/μL | LDH | 247 IU/L |
| Hb | 7.6 g/dL | ALP | 347 IU/L |
| Ht | 20.5 % | γ GTP | 114 IU/L |
| MCV | 91.1 fL | CRP | 5.49 mg/dL |
| MCH | 30.8 pg | | |
| MCHC | 33.8 % | | |
| Plt | 8.4万/ μ L | | |

♪ 緊急性が一番高いのはどれでしょうか？

| | |
|--|---|
| <p>1</p> <p>WBC 4100 /μL Hb 5.2 g/dL MCV 72.6 fL PLT 39.3万 /μL</p> | <p>2</p> <p>WBC 87,000 /μL Hb 11.6 g/dL MCV 99.1 fL PLT 42.6万 /μL</p> |
| <p>3</p> <p>WBC 7100 /μL Hb 13.5 g/dL MCV 91.9 fL PLT 2.3万 /μL</p> | <p>4</p> <p>WBC 960 /μL Hb 9.2 g/dL MCV 102.3 fL PLT 5.5万 /μL</p> |

➤ いずれの患者さんも, 症状はほとんどありません。